

配置薬剤の使用目安（ワクチン救護所限定）

2021.5.25.1

※アドレナリン以外の薬剤は、使い慣れていない場合
無理に使用する必要はなく、救急搬送を優先

1. アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」

適応：①アナフィラキシー ②急性低血圧・ショックなど

使用法：(0.7mL 捨てて) 0.3mL を大腿部中央の前外側に筋注、
5～15 分毎繰り返す

2. ミダフレッサ静注 0.1% (1V=10mL=10mg)

適応：痙攣・てんかん発作

使用法：高齢者 2.5mL、成人 5 mL を 1 分以上かけて静注

※呼吸抑制に注意。(アンビューバッグを用意)

2'. ホリゾン注射液 10mg (1A=2mL=10mg)

適応：痙攣・てんかん発作時

使用法：1A を筋肉内、または静脈内にできるだけ緩徐に注射。

※呼吸抑制に注意。(アンビューバッグを用意)

3. アタラックス P 注射液 25mg (1A=1mL=25mg)

適応：不安・緊張

使用法：① 1A 筋注（揉まないこと！！）

② 1A を生食 100ml に混注し点滴静注(30～60 分程度)

③ 1A を 1 分以上かけてできるだけゆっくり静注

4. ソル・コーテフ静注用 100mg, 500mg

適応：ショック・喘息発作

使用法：100～500mg を点滴内混注

5. フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 60mg

適応：じんま疹など

使用法：12 才以上：1 回 1 錠内服、7～12 才：1 回 1/2 錠内服

6. メプチンエア-10 μ g吸入 (初回のみ前準備として空打ちを2発)

適応：喘息発作


使用法：(成人 1 回 2 吸入、小児 1 回 1 吸入)

i) オープンマウス法 (介助者はフェイスシールド・手袋を)

- ① マスクをしたまま口を開けて息をはいてもらう。
- ② 口を開けたまま本人がマスクを外し、介助者が外からメプチンエア-を吹き込む。
- ③ すぐに口から息を深く吸って、マスクをして5秒間息を止める。
- ④ 成人の場合①～③をもう一度

ii) エアロチャンバープラス使用 (介助者はフェイスシールド・手袋を)

- ① マスクをしたまま口を開けて息をはいてもらう。
- ② エアロチャンバープラスにメプチンエア-をはめ込み1プッシュ
- ③ マスクを外し、エアロチャンバープラスを口に当てて、ゆっくりと深く吸い込む
- ④ マスクをして5秒間息を止める。
- ⑤ 成人の場合①～④をもう一度



※メプチンエア-は使用ごとにアルコール消毒

※エアロチャンバープラスの消毒方法

- ① 一人使用ごとに手袋をつけて行う
- ② 0.05%次亜塩素酸ナトリウム液に30分間つけ置き
- ③ 流水で洗い流す
- ④ 自然乾燥させる

※0.05%次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

メーカー (五十音順)	商品名	作り方の例
花王	ハイター キッチンハイター	水 1L に本商品 25mL (商品付属のキャップ 1 杯) [*] <small>※次亜塩素酸ナトリウムは、一般的にゆっくりと分解し、濃度が低下していきます。購入から3ヶ月以内の場合は、水 1L に本商品 10ml (商品付属のキャップ 1/2 杯) が目安です。</small>
カネヨ石鹸	カネヨブリーチ カネヨキッチンブリーチ	水 1L に本商品 10mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)
ミツエイ	ブリーチ キッチンブリーチ	水 1L に本商品 10mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)

(プライベートブランド)

ブランド名 (五十音順)	商品名	作り方の例
イオングループ (トップバリュ)	キッチン用漂白剤	水 1L に本商品 10mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)
西友/サニー/ リヴィン (きほんのき)	台所用漂白剤	水 1L に本商品 12mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)
セブン&アイ・ ホールディングス (セブンプレミアム ライフスタイル)	キッチンブリーチ	水 1L に本商品 10mL (商品付属のキャップ 1/2 杯)